



藥物指南

Mifepristone (MIF-eh-pris-tone) 藥錠，200 毫克，供口服使用

在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol 藥錠之前，請仔細閱讀此份資訊。這將幫助您瞭解治療如何發揮作用。本藥物指南無法取代您與醫療人員的討論。



GenBioPro

付諸實踐

關於 Mifepristone 藥錠 200 毫克，我應該知道哪些最重要的資訊？

我應該注意哪些症狀？雖然腹部痙攣和陰道出血是結束懷孕的預期狀況，但罕見情況下，嚴重且可能危及生命的出血、感染或其他問題可能在流產、手術流產、醫療流產或生產後發生。在這些情況下，需要盡快就醫。嚴重感染在極少數案例中導致死亡。目前並無使用 Mifepristone 藥錠 200 毫克併用 misoprostol 藥錠導致這些死亡的資訊。如果您有任何疑問、疑慮或問題，或者您擔心產生任何副作用或症狀，您應聯絡醫療人員。您可以在此寫下醫療人員的電話號碼：

()

如果您有以下任何情況，請務必立即聯絡醫療人員：

- **大量出血。**如果您連續兩小時出血到足以每小時浸透兩片厚的全尺寸衛生棉，或者如果您擔心大量出血，請立即聯絡醫療人員。每 100 名女性中約有 1 名出血可能相當嚴重，以至於需要進行手術程序（手術抽吸或子宮內膜搔刮術 [D&C]）。

- **腹痛或「感覺想吐」。**如果您在服用 misoprostol 後超過 24 小時出現腹痛或腹部不適，或者「感覺想吐」，包括無力、噁心、嘔吐或腹瀉，伴隨或未伴隨發燒，您應立即聯絡醫療人員。這些症狀可能是嚴重感染或其他問題（包括異位妊娠、子宮外孕）的徵象。
- **發燒。**在治療後幾天，如果您發燒達 100.4°F 或更高，且持續超過 4 小時，您應立即聯絡醫療人員。發燒可能是嚴重感染或其他問題的症狀。

如果您無法聯絡醫療人員，請前往最近的醫院急診室就診。

如果您在接受 Mifepristone 200 毫克藥錠併用 misoprostol 治療之後仍懷孕，該怎麼辦。若您仍懷孕，醫療人員將與您討論結束懷孕的手術程序。在許多情況下，可在醫師辦公室/診間進行此項手術程序。如果懷孕未結束，藥物導致先天缺陷的機率仍屬未知。

請與醫療人員討論。在您服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克之前，您應閱讀本藥物指南，且您和醫療人員應討論您使用 Mifepristone 藥錠 200 毫克的益處和風險。

什麼是 Mifepristone 藥錠 200 毫克？

Mifepristone 藥錠 200 毫克用於與另一種名為 misoprostol 處方藥併用的療程，以結束早期懷孕。早期懷孕是指自您最後一次月經開始後 70 天（10 週）內或更短的時間。Mifepristone 藥錠 200 毫克尚未獲准用於進一步結束懷孕。Mifepristone 藥錠 200 毫克會阻斷您持續懷孕所需的荷爾蒙。當您在第 1 天使用 Mifepristone 藥錠 200 毫克時，您也需要在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後 24 至 48 小時服用另一種稱為 misoprostol 的藥物，以造成流產從您的子宮流出。

懷孕可能會在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol 後 2 至 24 小時內造成流產從您的子宮流出。流產時，您將發生陰道出血和腹部痙攣，其症狀可能比平常的經期更嚴重。服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克的 100 名女性中，約有 2 至 7 名需要進行手術程序，因為並未完全流產或停止出血。

誰不應服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克？

有些患者不應服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克。如果您有下列情況，請勿服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克：

- 懷孕超過 70 天（10 週）。醫療人員可能會進行臨床檢查、超音波檢查或其他檢測，以確認您懷孕的時間有多長。
- 正在使用 IUD（子宮內避孕器或系統）。必須在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克之前取出。
- 醫療人員已告訴您有子宮外孕（異位妊娠）。
- 您的腎上腺有問題（慢性腎上腺衰竭）。
- 服用抗凝血劑。
- 有出血問題。
- 患有紫質症。
- 服用某些類固醇藥物。
- 對 Mifepristone、misoprostol 或含有 misoprostol 的藥物過敏，例如 Cytotec 或 Arthrotec。

如果您在服用此藥前不確定您的所有醫療狀況，請諮詢醫療人員，以瞭解您是否可以服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克。

在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克之前，我應告知醫療人員什麼？

在您服用 **Mifepristone 藥錠 200 毫克**之前，如果您有以下情況，請告知醫療人員：

- 無法在您的第一次回診後約 7 至 14 天內進行追蹤。
- 正在哺乳。Mifepristone 藥錠 200 毫克會進入您的母乳。Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol 療程對於哺乳嬰兒或乳汁製造的影響尚且未知。
- 正在使用藥物，包括處方藥和非處方藥、維他命和草藥補充劑。

Mifepristone 藥錠 200 毫克和某些其他藥物如果合併使用，可能會互相影響。這可能導致副作用。

我應如何服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克？

- Mifepristone 藥錠 200 毫克將由醫療人員或藥局給予。
- 您和醫療人員將規劃您服用 misoprostol 的最適當地點，因為此藥物可能導致出血、腹部痙攣、噁心、腹瀉，以及通常在服藥後 2 至 24 小時內開始出現的其他症狀。
- 大部分女性將在服用 misoprostol 藥錠後 2 至 24 小時內流產。

請遵循以下指示，瞭解如何服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol：口服 Mifepristone 藥錠 200 毫克（1 片藥錠）+ 頰塞 misoprostol 藥錠（4 片藥錠）

第 1 天：

- 口服 1 顆 Mifepristone 200 毫克藥錠。

服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後 24 至 48 小時：

- 服用 4 片 misoprostol 藥錠，方法是在每個頰袋（介於牙齒和臉頰之間的區域 請參閱圖 A）中放置 2 片藥錠 30 分鐘，然後用開水或其他液體吞服任何剩餘的藥物。




圖 A

2 顆藥錠在您的左臉頰與牙齦之間，
2 顆藥錠在您的右臉頰與牙齦之間。

- 如果您在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後 24 小時內或服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克 48 小時後服用 misoprostol，這些藥物可能無法發揮同樣的作用。
- Misoprostol 經常引起腹部痙攣、噁心、腹瀉和其他症狀。醫療人員可能會將治療這些症狀的藥物讓您帶回家服用。

第 7 至 14 天的追蹤評估：

- 此項追蹤評估非常重要。服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後約 7 至 14 天，您必須與醫療人員進行追蹤，以確保您的狀況良好、已出血且妊娠物已從您的子宮排出。
- 醫療人員將評估您的妊娠物是否已從子宮排出。若您持續懷孕，藥物導致先天缺陷的機率仍屬未知。若您仍懷孕，醫療人員將與您討論結束懷孕的手術程序。
- 若您的懷孕已結束，但尚未完全流產，醫療人員將與您討論其他選擇，包括等待、服用另一劑 misoprostol，或接受排空子宮的手術程序。

我何時應開始避孕？

懷孕結束後，您可以立即再次懷孕。如果您不想再次懷孕，請在您的懷孕結束後或再次開始有性行為之前開始使用避孕措施。

在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol 藥錠時，我應避免哪些事情？

在治療期間的任何時候，若未先詢問醫療人員，請勿使用任何其他處方藥或非處方藥（包括草藥或補充劑），因為這些藥物可能會干擾治療。請向醫療人員詢問您可使用哪些止痛藥以及會有其他副作用。

Mifepristone 藥錠 200 毫克和 misoprostol 有哪些可能的副作用？

Mifepristone 藥錠 200 毫克可能引起嚴重副作用。請參閱「關於 Mifepristone 藥錠 200 毫克，我應該知道哪些最重要的資訊？」

腹部痙攣和出血。預期此治療會引起腹部痙攣和陰道出血。通常，這些症狀代表治療正在發揮作用。有時您可能會出現腹部痙攣和出血但仍持續懷孕。這就是為什麼您必須在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後約 7 至 14 天，與醫療人員進行追蹤。請參見「我應如何服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克？」，以取得有關您懷孕狀況追蹤評估的更多資訊。若您在服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後仍未出血，則當您服用 Mifepristone 藥錠 200 毫克後 24 至 48 小時接著服用 misoprostol 後，可能會開始出血。預期平均出血或點狀出血 9 至 16 天，且可能持續最多 30 天。您的出血可能類似於或大於正常經血量。您可能會看到血塊和組織。這是流產預期會出現的狀況。

Mifepristone 藥錠 200 毫克最常見的副作用包括：噁心、無力、發燒/畏寒、嘔吐、頭痛、腹瀉和頭暈。醫療人員將告訴您如何處置任何疼痛或其他副作用。這些並非 Mifepristone 藥錠 200 毫克的所有可能副作用。

有關困擾您或不會消退的其他副作用，請致電醫療人員尋求醫療建議。您可撥打電話 1-800-FDA-1088 向 FDA 通報副作用。

關於 Mifepristone 藥錠 200 毫克安全性和有效性的一般資訊。

有時會為了藥物指南所列目的以外的理由開立藥物。本藥物指南彙整了有關 Mifepristone 藥錠 200 毫克的最重要資訊。如果您希望獲得更多資訊，請與醫療人員討論。您可以向醫療人員索取為醫療專業人員所撰寫的 Mifepristone 藥錠 200 毫克相關資訊。

如需有關 Mifepristone 藥錠
200 毫克的更多資訊，
請造訪網址

www.MIFEINFO.com

或致電

1-855-MIFE-INFO

(1-855-643-3463)。